# Grandes cultures

Le 22 Juillet 1992

N° 7 Supplément N° 1

BETTERAVES

Cercosporiose: intervenir.

MAIS

Pyrale : le traitement doit être effectué. Pucerons: à surveiller, (conserver la fiche couleur)

BLE

Reverdissement

## **BETTERAVES**

# **MALADIES**

### Situation

- Cercosporiose : de nombreuses parcelles présentent des symptômes sous forme de très petits foyers. Localement, la pression maladie est plus importante.
  - Oïdium: peu présent pour l'instant; il est signalé à COGNAT-LYONNE (03).
  - Rouille et Ramulariose : absentes.

#### Préconisation

Une visite de vos parcelles s'impose.

Les conditions climatiques actuelles (pluies orageuses) sont très favorables à la

cercosporiose.

Un traitement fongicide sera à effectuer rapidement.

Il faut adopter la stratégie n° 2 indiquée sur la fiche couleur jointe à notre bulletin n° 7. Employer un produit performant à base de triazoles, notamment en cas de cercosporiose très implantée (IMPACT, GEYSER, ALTO BS, PUNCH CS...). L'emploi de spécialités à base de fentine hydroxyde (TOPSUC) et de fentine acétate (BRETAN) peut aussi s'envisager en préventif.

Il faudra ensuite appliquer un produit à base de triazole au deuxième traitement.

N° de série : 821

63 370 LEMPDES

- SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX © 73.42.14.83 RN 89 Marmilhat
- PUBLICATION MENSUELLE
- Directeur Gérant : B . MORIN
- CPPAP.N°2315AD Abonnement Annuel: 210 F
- Chèques : Régie de recettes D.R.A.F.
- Imprimerie D.R.A.F.

P53 101

partielle est soumise à notre autorisation © Toute reproduction, mêm

# ADDITIF AU TABLEAU DES FONGICIDES BETTERAVE

Matières actives	Spécialités commerciales	Dose Spécialité par hectare	Oïdium	Ramulariose	Cercosporiose	Rouille
Propiconazole	PRACTIS	2 géludoses	Très bon A confirmer			
Flusilazol	CAPITAN	0,51	Très bon A confirmer	Bon A confirmer	Bon A confirmer	Bon A confirmer

Pour chacun de ces produits, nos références quant à la rémanence sont insuffisantes.

## MAIS

# PYRALE

#### O Situation

L'activité se poursuit, mais a fortement diminué depuis 8 jours.

- Cage d'élevage à MARMILHAT (63) : "Pic" entre le 10 et le 17 juillet.
- Pièges sexuels : activité plus importante vers le 10 juillet.

# O Préconisation

Il est maintenant trop tard pour intervenir (limite le 18 juillet).

# **PUCERONS**

#### O Situation

Ils sont peu nombreux tant sur feuilles que sur épis et panicules. les insectes auxiliaires sont nombreux (coccinelles, syrphes...). Les champignons entomophtorales détruisent aussi beaucoup de pucerons.

# O Préconisation

Aucune intervention aphicide ne se justifie.

Maintenir une surveillance, notamment l'espèce Rhopalosiphum padi. Le seuil d'intervention est de 1 panicule sur 2 colonisé.

NB. Conserver la fiche jointe "Les pucerons du maïs" pour mieux reconnaître ces insectes.

## BLE

## REVERDISSEMENT

# O Situation

Un reverdissement des blés est noté en Limagne (63).

#### O Préconisation

Il faut agir au cas par cas et surtout à moindre frais.

- "Culture ancienne" relativement correcte avec quelques verdillons : il faut récolter rapidement. L'application d'un dessicant comme REGLONE à 2 à 3 l/ha + Agral peut s'envisager 4 à 7 jours avant pour faciliter la récolte et la conservation des grains, par voie terrestre uniquement.
- "Culture ancienne" mauvaise avec des repousses nombreuses "assez correctes" : il faut attendre la maturité des repousses sans faire de frais de protection.